10 Enciclopedia Argentina de

PLANTAS y FLORES

₳ 1.20



PROXIMO NUMERO



Sumario Nº 10

- **Plantas con flores** 145
  "Margarita"
- **Plantas de interior** 148
  "Dracena"
- **Guía de plantas** 151
  Aljaba - Corona de novia - Peperomia - Filodendro - Clavelina - Verbena - Hiedra - Lamiun -
- **Entreténgase con las plantas** 155
  Poda del rosal
- **Conocimientos generales** 158
  El jardín: combinación de colores y sus efectos
- **Calendario de siembras (V)** 160

SIGNIFICADO DE LOS SIMBOLOS

● Floración en Primavera

● Floración en Verano

● Floración en Otoño

● Floración en Invierno

● Exposición a pleno sol

● Exposición a semisombra

● Exposición a la sombra

● Riego abundante

● Riego moderado

● Riego escaso

A NUESTROS LECTORES

ENCICLOPEDIA ARGENTINA DE PLANTAS Y FLORES es una obra compuesta de 30 fascículos de aparición semanal que se encuadernarán en dos volúmenes de 15 fascículos cada uno.
El fascículo nº 1 constará de 20 páginas interiores y los siguientes de 16 con sus correspondientes cubiertas. Cada 15 apariciones se pondrá a la venta la tapa correspondiente para su encuadernación.

Enciclopedia Argentina de PLANTAS y FLORES

ENCICLOPEDIA ARGENTINA DE PLANTAS Y FLORES

Volúmen 1 - Fascículo 10 - Año 1986.

Es una obra editada por LIRES S.R.L. - Gral Artigas 3050 3º B. Capital Federal.

Director Responsable: ING. ROBERTO ISHIKAWA
Director Editorial: ALFREDO SCUTTI
Diagramación: HECTOR B. CURCIO
Dibujos: HORACIO DOMINGUES
Fotografía: HECTOR FEDERICO
Fotocromos: FOTOCROMOS BOLIVAR S.R.L.

Impresa en Talleres Gráficos Recali - Perdriel 1534 Cap. Fed. Rep. Argentina
Queda hecho el depósito que previene la Ley 11723

Todos los derechos de la obra reservados por LIRES S.R.L. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización previa de la editorial.

MIEMBRO DE LA ASOCIACION ARGENTINA DE EDITORES DE REVISTAS
Distribuidor en Capital Federal: Juan Vidal e Hijos - C. Pellegrini 739 1º - 4.
Distribuidor en Interior: Dist. General de Publicaciones - H. Yrigoyen 1450 - Cap.
Registro de la Propiedad Intelectual: En trámite.
Correo Argentina Central "B" y Suc. Cabeceras.
Franqueo pagado Concesión Nº 4558
Tarifa Reducida En Trámite

Canje por encuadernados: Av. Larrazábal 567 - Capital Federal

"Margarita" Chrysanthemum frutescens L.

Chrysantemum frutescens; de vistosa floración primavero-estival

Arbusto leñoso de 0,60 a 1,20 m de altura, copa globosa y muy ramificado. Sus inflorescencias (capítulo) de 3 a 6 cm de diámetro se componen de flores amarillas agrupadas en el centro rodeadas de lígulas (*) blancas.

Es de rápido crecimiento, fácil multiplicación, tolera las heladas suaves; se cultiva en jardines por su floración vistosa que se inicia en la primavera y continúa hasta finalizar el verano.

● Suelo

La favorece los suelos profundos, medianamente fértiles y sueltos. Los terrenos compactos o anegables limitan el crecimiento y la vida de la planta. El sustrato muy fértil con alto contenido de materia orgánica produce ejemplares con gran cantidad de brotes y escasa floración; la planta se vuelca con facilidad después de lluvias intensas con viento.

El suelo demasiado ácido la perjudica.

● Abono

La incorporación de 50-100 g de harina de huesos en el hoyo de plantación asegura la floración del primer año. Desde el segundo año se utilizan 3-5 gramos de fertilizante completo (tipo 15-15-15) esparcido en la zona de las raíces cada 30-35 días, desde principios de primavera hasta finalizar la floración.

La pulverización con una solución de ácido giberélico simultáneamente con la primera fertilización primaveral anticipa y aumenta la floración de la margarita.

● Riego

Abundante, cada 2-3 días en primavera y verano, preferentemente al atarceder; en invierno cada 10-15 días sin anegar las raíces.

● Lugar apropiado

Es conveniente cultivarla aislada de otras especies para que se luzca por su copa globosa en época de floración. La favorece la luz solar directa de la mañana y soporta las heladas si cuenta con la protección de paredes o arbustos colocados hacia el sur-sudoeste.

El terreno con una pendiente suave evita el anegamiento y la putrefacción de las raíces.

● Propagación

Se realiza por esqueje a principios de la primavera o a fines del verano.

● Cultivo en el jardín

○ Se plantan en el jardín desde mediados de setiembre en el terreno previamente preparado y abonado con harina de huesos.

(*) Lígula: corola en forma de pequeña lengua de las flores periféricas de los capítulos de algunas especies de Compuestas (familia botánica).

Flores en capítulos simples

○ Es conveniente elegir plantas robustas, ramificadas desde la base, descartando ejemplares con tallos débiles o dañados. La planta sin ramificar se despunta a 5 cm del ápice para activar el desarrollo de los brotes laterales.

○ Requiere cuatro horas mínimas diarias de luz solar directa en primavera para una floración abundante; en sitios con menor luminosidad los tallos crecen débiles y alargados, la floración es escasa y las hojas de la parte interna de la copa se secan progresivamente.

○ Los restos de las flores secas se cortan para favorecer la continuidad de la floración hasta fines del verano.

○ Los brotes para la preparación de esquejes se cortan entre enero y febrero. Las plantas logradas en otoño se mantienen en un lugar protegido del frío hasta la plantación a mediados de setiembre.

○ Las plantas adultas del jardín se protegen con papel de periódico en las noches de helada.

○ La poda se efectúa al iniciarse la brotación primaveral acortando algunas ramas; éstas se utilizan para la multiplicación.

○ También se cultivan variedades con flores amarillas.

● Distancia de plantación

○ Los ejemplares se colocan separados a más de 90 cm de paredes, caminos o senderos y a más de 1,20 metros de la copa de otros arbustos para conservar su forma globosa.

○ Los macizos se forman plantados a 1-1,10 metros de distancia.

● ESQUEJE DE PRIMAVERA.



Se corta el gajo de 15-20 cm con parte de rama del año anterior



Se quitan las hojas de los 10 centímetros basales



La zona de corte se unta con hormona de enraizamiento.

El esqueje se introduce en el sustrato húmedo de resaca de río y tierra negra en partes iguales.



Se riega y coloca en un sitio protegido de la luz solar directa (durante una semana) y se expone gradualmente a mayor luminosidad. Enraíza en tres semanas.

Margarita amarilla



● ESQUEJE DE VERANO

Se elige y corta un brote herbáceo de 8-10 cm de largo con 3-4 pares de hojas (enero-febrero).

el esqueje se prepara cortando por debajo de una hoja.



Se corta el par inferior de hojas.



La base se unta con hormona de enraizamiento.



Con una varilla o un lápiz se hacen perforaciones en el sustrato.

El esqueje se introduce de modo que las hojas queden a nivel del suelo

Se riega y cubre con un plástico. La cubierta se retira durante unos minutos diarios.



En un lugar luminoso, protegido de la luz solar directa y con el sustrato siempre húmedo forman raíces en 2-3 semanas.

● DISTANCIA DE PLANTACION



"Dracena"

Se conocen con este nombre numerosas especies de los géneros Cordyline y Dracaena. Estrechamente emparentadas, la denominación de ambos géneros se presta a confusión y se las clasifica a veces erróneamente.

Son plantas de interior de variados orígenes, bastante rústicas y con cierta similitud con las palmeras. En general son de lento desarrollo, crecen 10-15 cm por año y los ejemplares adultos cultivados en interior alcanzan de 40 cm a 2,50 m de altura, según la especie considerada.

Las especies de ambos géneros se cultivan en condiciones similares.

● Suelo para la dracena

Prospera en un sustrato compuesto por resaca de río, turba y tierra negra en partes iguales con una profundidad mínima de 20 cm.

● Temperatura

Prefiere un ambiente cálido entre 18 y 21°C, tolera hasta 10°C si se reduce el riego. Sobre los 24°C se producen daños en el follaje con atmósfera seca.

● Riego

El sustrato se mantiene húmedo, evitando la saturación permanente, riegos moderados, una a dos veces por semana en verano y una vez por semana en invierno. El uso de agua de lluvia constituye una ventaja.

● Ambiente

En general la favorece la luminosidad plena, evitando la luz solar directa en verano. El follaje rojo de algunas variedades se mantiene solo con luz intensa y expuesto a los rayos solares de las primeras horas de la mañana.

Tolera las variaciones de humedad del ambiente y la afecta las corrientes de aire frío.

● Abono

Riegos cada 30 días con una solución de 0,5 g de sulfato de amonio en primavera y verano favorecen la brotación.

● Algunas dracenas cultivadas

Cordyline terminalis: posee hojas oblongolanceoladas, verde oscuras con una sombra roja cuando son jóvenes; conservan los márgenes rojos al completar su crecimiento. La variedad tricolor posee las hojas más anchas con zonas rojas, rosas o amarillentas.

Dracaena fragans: planta arborescente que alcanza 2-3 m de altura cultivada en interior. Sus hojas son anchas y de color verde oscuro. La variedad "Massangeana" posee hojas con una franja central de líneas verde pálido y amarillentas.

Dracaena marginata: de hojas estrechas de color verde con bordes rojos que nacen de un fuerte tallo central, abriéndose suavemente. La variedad "Tricolor" posee el follaje con una coloración rojizo-grisácea y la línea roja en el borde.

Dracaena deremensis var. "Warneckii": de hojas largas de color verde oscuro bordeadas por líneas crema o blancas.

Dracaena sanderiana: de tallos delgados, hojas cortas y espaciadas de color verde claro con un ancho borde blanco crema.

Dracaena schryveriana: con hojas de color verde claro y bordes amarillos.

Dracaena deremensis var. "Warneckii"

Dracaena schyveriana

Dracaena fragans "Massangeana"

Dracaena rubia

● MULTIPLICACION: POR ESQUEJE APICAL

Se corta un brote con más de dos pares de hojas y 8-10 cm de largo.

El esqueje se prepara cortando el tallo justo por debajo de una hoja.

Se quita el par inferior de hojas

La superficie de corte se unta con hormona

Con una varilla o un lápiz se hace un pequeño hoyo en el sustrato de turba húmeda y arena o perlita en partes iguales.

Se coloca el esqueje en el hoyo con las hojas a nivel del sustrato.

Se riega bien y tapa con un plástico transparente. Se deja ventilar unos minutos diarios.



En 4-5 semanas la nueva planta se pasa a una maceta con sustrato normal.

Dracaena marginata "Tricolor"

● MULTIPLICACION: POR ESQUEJE DE TALLO



Se cortan secciones de tallo de unos 7-8 cm que incluyan un nudo.

La parte inferior de cada sección se unta con hormona de enraizamiento.



Los trozos se colocan en forma vertical, totalmente cubiertos con el sustrato de turba y arena o perlita. Se riega y cubre con un plástico.

En ambiente cálido (22-24°C) cada trozo forma una nueva planta en 5-6 semanas.

73 ● "ALJABA"

Fuchsia magellanica Lam.

Familia: Enoteráceas
Origen: Perú, Chile, Argentina
Características: arbusto erguido, a veces apoyante, muy ramificado.
Hojas: lanceoladas, pubescentes a lo largo de las nervaduras y el margen; de 3 a 8 cm de largo.
Flores: solitarias, axilares, colgantes; sépalos rojos y pétalos purpurinos o morados.
Epoca de floración: fines de primavera y verano.
Destino: jardín y balcón.
Adaptación: buena y de fácil cultivo.
Suelo: profundo y fértil. Sustrato de resaca de río, tierra negra y arena o perlita.
Luminosidad: plena con luz solar directa o a media sombra.
Resistencia al frío: requiere protección de las heladas.
Humedad del ambiente: prefiere atmósfera húmeda.
Riego: cada 2-3 días en primavera-verano; cada 15 días en invierno.
Abono: 20-50 gramos de harina de huesos en primavera.
Causas parasitarias: resistente.
Propagación: esqueje en primavera.
Cuidados: Poda y fertilización en primavera.

74 ● "CLAVELINA"

Dianthus plumarius L.

Familia: Cariofiláceas
Origen: Europa y Asia.
Características: planta cespitosa, perenne de 15-30 cm de altura.
Hojas: alargadas, extendidas y levemente grisáceas.
Flores: medianas, simples o dobles reunidas en número de 2-3; rosados, purpúreos, blancos o disciplinados.
Epoca de floración: primavera y verano.
Destino: jardín, balcón y macetero al aire libre.
Adaptación: buena de fácil cultivo y muy florífera.
Suelo: suelto y fértil. Sustrato con resaca de río y tierra negra.
Luminosidad: pleno sol.
Resistencia al frío: tolera heladas suaves.
Humedad del ambiente: prefiere atmósfera con escasa humedad.
Riego: cada dos días en primavera y verano. Cada semana en invierno.
Abono: 200-300 g de harina de huesos por metro cuadrado al plantarla en primavera. 20 g de fertilizante completo al año siguiente.
Causas parasitarias: poco atacado.
Propagación: siembra o esqueje en primavera.
Cuidados: protección de las heladas intensas. Renovación del suelo cada tres años.

75 ● "CORONA DE NOVIA"

Spiraea cantoniensis Lour.

Familia: Rosáceas.
Origen: China y Japón.
Características: arbusto de follaje caduco, muy ramificado de 1-2 metros de altura, con ramitas delgadas y flexibles.
Hojas: lanceoladas o rómbico-lanceoladas de 2-6 cm de largo.
Flores: blancas de 1 cm de diámetro dispuestas en inflorescencia sobre cortas ramitas laterales.
Epoca de floración: primavera.
Destino: jardín y balcón.
Adaptación: buena, de fácil cultivo y muy florífera.
Suelo: fértil, suelto y con profundidad mínima de 25 cm.
Luminosidad: a pleno sol.
Resistencia al frío: tolera helada intensas.
Humedad del ambiente: se adapta a distintas condiciones de humedad.
Riego: cada 3-4 días en primavera y verano; cada 10 días en invierno.
Abono: 100-200 gramos de harina de huesos a principios de primavera.
Causas parasitarias: resistente.
Propagación: esqueje en verano y otoño.
Cuidados: buena exposición solar y poda al finalizar la floración.

76 ● "FILODENDRO"

Phylodendron cordatum (Vell.)

Familia: Aráceas
Origen: Brasil y Perú.
Características: planta trepadora cultivada por su follaje.
Hojas: Coriáceas, oblongas cordadas de 15-20 cm de largo por 7-10 cm de ancho y largo pecíolo.
Flores: poco vistosas.
Epoca de floración: verano.
Destino: interior.
Adaptación: buena, rústica, de fácil cultivo.
Suelo: suelto y profundo; sustrato de resaca de río y tierra negra en partes iguales.
Luminosidad: plena evitando la luz solar directa.
Resistencia al frío: escasa, no tolera temperaturas inferiores a 8ºC.
Humedad del ambiente: prefiere atmósfera húmeda; tolera el rociado del follaje.
Riego: dos veces por semana en verano; una vez en invierno.
Abono: 1 gramo de sulfato de amonio disuelto en el agua de riego en primavera.
Causas parasitarias: poco afectado.
Propagación: esqueje de tallo en primavera.
Cuidados: cambio de maceta en primavera y uso de tutores.

77 ● "HIEDRA"

Hedera helix L.

Familia: Araliáceas.
Origen: Cuenca del Mediterráneo.
Características: enredadera leñosa, trepadora, provista de raíces adventicias a lo largo del tallo. Se cultivan numerosas variedades por su follaje.
Hojas: enteras o lobuladas de 5-10 cm de largo.
Flores: pequeñas, amarillentas agrupadas en inflorescencias poco vistosas.
Epoca de floración: primavera.
Destino: jardín, balcón e interior.
Adaptación: buena, rústica de fácil cultivo.
Suelo: suelto y fértil. Sustrato de resaca de río y tierra negra en partes iguales.
Luminosidad: plena con luz solar directa o a media sombra.
Resistencia al frío: buena, tolera hasta -2ºC.
Humedad del ambiente: prefiere atmósfera con humedad; tolera el rociado del follaje.
Riego: una a dos veces por semana en verano; cada 2 semanas en invierno.
Abono: un gramo de sulfato de amonio disuelto en el agua de riego (primavera).
Causas parasitarias: cochinillas. Se controla con insecticida sistémico (dimetoato).
Propagación: esqueje en primavera.
Cuidados: cambio de maceta en primavera.

78 ● "LAMIUN"

Lamiun galeobdolon (L.) Crantz

Familia: Labiadas.
Origen: Eurasia.
Características: planta herbácea estolonífera, perenne con tallos cuadrangulares. Cultivada por su follaje.
Hojas: simples, verde claro, de 3-8 cm de largo con una mácula plateada en forma de herradura.
Flores: amarillas de 1-2 cm de largo dispuestas en inflorescencia.
Epoca de floración: primavera.
Destino: jardín, balcón e interior.
Adaptación: buena, rústica, de fácil cultivo.
Suelo: suelto y fértil. Sustrato de resaca de río o turba y tierra negra.
Luminosidad: plena con luz solar directa o a media sombra.
Resistencia al frío: tolera hasta 3-4ºC
Humedad del ambiente: prefiere atmósfera húmeda.
Riego: cada 2-3 días en verano y 5 días en invierno en el jardín; día por medio en verano y cada semana en invierno en interior.
Abono: un gramo de sulfato de amonio disuelto en el agua de riego (primavera).
Causas parasitarias: poco afectado.
Propagación: estolones en primavera.
Cuidados: cultivada en interior, cambio de maceta en primavera.

79 ● "PEPEROMIA"

Peperomia obtusifolia (L.)

Familia: Piperáceas
Origen: América tropical
Características: planta herbácea estolonífera, de hasta 20 cm de altura, con un tallo de unos 5 mm de diámetro. Cultivada por su follaje.
Hojas: alternas, redondeadas de 5 a 15 cm de largo por 3-8 cm de ancho.
Flores: muy pequeñas, poco vistosas agrupadas en inflorescencia.
Epoca de floración: verano.
Destino: interior.
Adaptación: buena y rústica.
Suelo: sustrato de resaca de río, turba y tierra negra en partes iguales.
Luminosidad: plena evitando la luz solar directa.
Resistencia al frío: escasa, no tolera temperaturas inferiores a 10°C
Humedad del ambiente: prefiere atmósfera húmeda.
Riego: moderado, cada 4-5 días en verano y 8-10 días en invierno.
Abono: riegos con solución de 0,5 g de sulfato de amonio en un litro de agua.
Causas parasitarias: podredumbre de la base del tallo.
Propagación: esqueje de tallo en primavera.
Cuidados: cambio de maceta y poda en primavera. Evitar riegos excesivos.

80 ● "VERBENA"

Verbena hybrida

Familia: Verbenáceas
Origen: cultígena
Características: planta herbácea perenne, rizomatosa de hasta 50 cm de altura, frecuentemente cultivada como anual.
Hojas: coriáceas, rugosas, lanceoladas de 3-6 cm de largo.
Flores: de 5 a 6 mm de diámetro, dispuestas en inflorescencia y colores variados.
Epoca de floración: primavera y verano.
Destino: macizos y borduras en jardines; balcones y macetero al aire libre.
Adaptación: buena, de fácil cultivo.
Suelo: suelto y fértil con agregado de resaca de río o mantillo.
Luminosidad: a pleno sol.
Resistencia al frío: daños con menos de 3°C.
Humedad del ambiente: tolera atmósfera con escasa humedad.
Riego: cada 2-3 días hasta finalizar la floración, cada semana en invierno.
Abono: 200-300 g de harina de huesos por m2 antes de la plantación.
Causas parasitarias: orugas, se controla con

Poda del rosal

El rosal florece sobre brotes que se originan en las yemas formadas a fines de la temporada anterior.

Las ramas de más de un año normalmente no forman brotes floríferos y consumen parte de los nutrientes necesarios para la producción de nuevas ramas y flores.

● Objetivo de la poda

○ Eliminar las ramas muertas, enfermas o mal formadas.
○ Reducir al mínimo necesario las ramas de más de un año.
○ Mantener la forma equilibrada de la planta, lograr un desarrollo vigoroso y regular la producción de flores.

● Corte de la rama

La poda se efectúa por encima de una yema. El corte correcto permite el desarrollo vigoroso de las yemas sin perjudicar la integridad de la planta.

Se realiza a un centímetro de la yema, con una inclinación aproximada a los 45º, el corte debe ser neto sin quebraduras y en dirección opuesta a la yema.

● CORTE DE LA RAMA



Corte correcto de la rama encima de la yema.

El rosal florece sobre ramas nuevas.





A.- Corte demasiado alto
B.- Corte demasiado cerca de la yema
C.- Corte inclinado hacia la yema
D.- Corte demasiado oblicuo
E.- Corte con herramienta desafilada
F.- Corte correcto

La poda intensa favorece la brotación vigorosa.

● Momento de podar

Existen distintos criterios sobre la época oportuna. La poda de agosto a mediados de setiembre asegura el desarrollo vegetativo y evita el perjuicio de las heladas.

El rosal que se poda en abril o mayo puede brotar en el período cálido de la segunda quincena de junio; las heladas posteriores dañan seriamente la brotación de las ramas podadas.

● Epoca adecuada

A: Planta en etapa de reposo

A_1: rama podada con anticipación
A_2: rama sin poda



B: Brotación en el período cálido de junio

B_1: Brotan las únicas yemas
B_2: Brotan las yemas terminales solamente

C: Poda de agosto-setiembre

C_1: Rama podada anticipadamente con brotes helados
C_2: La poda tardía se efectúa debajo de los brotes dañados en la rama que no fue podada anteriormente.

● Rosales de pie bajo: híbridas de té

○ Se quitan las ramas enfermas, débiles o que se entrecruzan.
○ Los vástagos se acortan hasta unos 10-20 cm según el vigor de la rama, dejando entre 3 a 6 yemas.
○ Para obtener flores de tallo largo se efectúa una poda intensa, con 2-3 yemas; más yemas producen floración en tallos cortos.

● Poda de rejuvenecimiento

○ Se realiza en ejemplares que no se podaron en varios años.





El jardín:

combinación de colores y sus efectos

Con la amplia gama de colores de follajes, flores y frutos, utilizada con capacidad y creatividad, se logran múltiples efectos decorativos.

El ordenamiento sobrio y sensato de las tonalidades constituye un factor de enorme importancia.

En toda estructura acertada existe un efecto dominante complementado por otros de menor relieve; el conjunto es el que produce esa nota agradable e interesante.

El verde y sus tonalidades crean el ambiente apropiado para destacar las formas y los colores de los diversos elementos que integran el jardín.

La luminosidad marca la intensidad de los colores. Los tonos pálidos se favorecen en entornos de sombra por contraste, perdiéndose a plena luz. Violetas y azules necesitan luz intensa para cobrar vida; en sitios sombríos no se definen.

La distribución de macizos con coloración precisa y uniforme es uno de los sistemas más simple y efectivo aplicado en jardines de dimensiones reducidas o en determinadas zonas de jardines extensos.

Un fondo neutro o levemente contrastado realza el color elegido. Las flores blancas o el follaje grisáceo precisan algunos toques de rojo o púrpura que brindan calidez.

Eleagnus pungens "Aureo-variegata"

El uso de colores sin discriminar se justifica en los macizos de un jardín informal. Las zonas carentes de buena luminosidad se aclaran con flores de tonos cálidos y con vegetación de follaje disciplinado. Cumple este objetivo el Eleagnus pungens var. Reflexa que mantiene su variegado intenso en la sombra.



Contraste definido del liquidambar en otoño

Los tonos fríos no alcanzan a definirse en zonas de penumbra

Los detalles de color dispersos en el jardín confieren una nota alegre e informal. Un grupo de petunias cumple con acierto el objetivo.

Combinación de follajes variegado, rojo-purpúreo y grisáceo: acentúa efectos y suaviza líneas.

Especies florales y ornamentales, Características y usos. Calendario de siembra.

Nº	GENERO Y ESPECIE	NOMBRE COMUN	FAMILIA	ORIGEN	CICLO	ALTURA (cm)	DESTINO	EPOCA DE FLORACION
73	Helianthemum nummularium	Helianthemo	Cistáceas	Mediterráneo	Perenne	40-60	Ornamental	Primavera-Verano
74	Helianthus annus	Girasol	Compuestas	Amér. Boreal	Anual	60	Ornamental	Verano
75	Helichrysum bracteatum	Siempreviva	Compuestas	Asia	Anual-Bienal	30-60	Orn./Corte	Verano
76	Heliopsis helianthoides	Girasolcito	Compuestas	Amér. Boreal	Perenne	30-50	Ornamental	Verano
77	Iberis umbellata	Flor de nieve	Crucíferas	Sur Europa	Anual	60-70	Bordura	Verano-Otoño-Inv.
78	Impatiens balsamina	Brinco	Balsamináceas	Asia	Anual	40-50	Ornamental	Verano
79	Impatiens sultani	Alegría del Hogar	Balsamináceas	Zanzibar	Perenne	20-40	Ornamental	Prim.-Verano-Otoño
80	Ipomea purpurea	Campanilla	Convolvuláceas	Amér. tropical	Perenne	—	Enredadera	Verano
81	Ipomea leari	Campanilla	Convolvuláceas	Argentina	Perenne	—	Enredadera	Verano
82	Kochia scoparia var. trichophylla	Morenita	Quenopodiáceas	Europa-Asia	Anual	40-60	Ornamental	Verano
83	Lathyrus odoratus	Arvejilla de olor	Leguminosas	Sur Europa	Anual	40-60	Corte	Primavera
84	Lathyrus latifolius	Arvejilla perenne	Leguminosas	Europa	Perenne	40-60	Corte	Prim.-Verano-Otoño
85	Limonium sinuatum	Statice	Plumbagináceas	Mediterráneo	Perenne	60-70	Corte	Primavera-Verano
86	Linaria maroceana	Linaria	Escrofuláriaceas	Marruecos	Anual	40-60	Corte	Primavera-Verano
87	Linum grandiflorum	Lino	Lináceas	Norte de Africa	Anual	40-60	Ornamental	Primavera
88	Lobelia erinus	Lobelia	Campanuláceas	Sudáfrica	Anual	20-30	Bordura	Prim.-Verano-Otoño
89	Lunaria annua	Moneda del papa	Crucíferas	Europa	Anual	40-60	Ornamental	Primavera-Verano

Nº	SIEMBRA: ALMACIGO: Bajo vidrio	SIEMBRA: ALMACIGO: aire libre	SIEMBRA: Asiento	SEMILLA: GERMINACION: temp.ºC	SEMILLA: GERMINACION: días	SEMILLA: GERMINACION: Neces Luz	SEMILLA: Longevidad (años)	SEMILLA: Cantidad en 1 gramo	OTRAS FORMAS DE PROPAGACION
73	feb/abr.	ago/oct.	—	20-30	14-17	si	1-2	300	
74	—	—	ago/oct.	20-35	6-14	si	2-3	25	
75	—	ago/set	—	20	7-10	si	1-2	1.200	
76	—	ago/nov.	—	20-30	7-12	si	2-3	500	Div. mata primavera
77	—	ago/nov.	—	20-30	6-10	si	4-5	250	
78	jul/ago.	set/oct.	oct/dic.	20-25	3-6	no	4-5	100	
79	ago/set.	set/nov.	—	20-25	4-7	si	3-4	2.000	
80	—	—	ago/oct.	20-25	5-10	si	2-4	40	
81	—	—	ago/oct.	20-25	5-10	si	2-4	40-50	
82	—	—	ago/oct.	20-25	3-6	si	2	1.200	
83	—	—	feb/set.	15-20	5-10	si	2-4	12	
84	—	—	mar/set.	15-20	5-10	si	2-4	20	
85	—	set/abr.	—	15-18	5-9	no	2	1.400	
86	—	—	jul/nov.	15-20	4-7	si	2	300-400	
87	—	—	feb/nov.	15-20	12-15	si	5	400	
88	mar/ab/ag/no.	—	—	20-30	12-16	no	4	25.000	
89	abr/jul.	ago/nov.	set/nov.	15	12-15	si	1-2	250	

Arreglos Florales

MACETERO COMPUESTO POR:

1- FICUS BENJAMINA
2- DIZYGOTHECA ELEGANTISSIMA
3- ASPLENIUM NIDUS
4- PEPEROMIA CAPERATA
5- NEOREGELIA CAROLINE "TRICOLOR"



ARREGLOS FLORALES
(Ver en la Contratapa la realización del macetero)